

Pelethrocin®

DIOSMINE + HESPERIDINE

Powlekane tabletki (450mg+50mg)

Skład: Składniki czynne: diosmina 450mg/tab, hesperydyna 50mg/tabletkę
Składniki pomocnicze: sól sodowa glukonianu skrobiowego, mikrokrystaliczna celuloza, żelatyna, stearynian magnezu, talk, wosk pszczeli biały, glicerol, hypromelose 2190, macrogol 6000, sól sodowa siarczanu laurynowego, tlenki żelaza E172, dwutlenek tytanu E171,

Postać leku: tabletki powlekane

Zawartość składników czynnych: Każda tabletkę zawiera diosminę 450mg i hesperydynę 50mg

Opakowanie: Pudełko zawiera 30 tabletek w blistrach.

Kategoria terapeutyczna leku: Leczenie zachowawcze objawów przewlekłej niewydolności żylną w obrębie kończyn dolnych.

Co powinno się wiedzieć o leku przepisany Pan/Panu przez Waszego lekarza?

Informacja ogólna: Lek zwiększa napięcie żylną i działa ochronnie na układ żylny.

W obrębie układu żylną kurczy rozszerzone chorobowo naczynia żylną zmniejszając zastój żylny. W obrębie mikrokrążenia przywraca sprawność kapilar i zwiększa ich wytrzymałość i odporność na czynniki uszkadzające. Badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby na ludziach, przy użyciu metod umożliwiających ilościową ocenę działania hemodynamicznego w układzie żylnym, potwierdziły właściwości farmakologiczne leku. Najlepszą relację dawki do efektu zaobserwowano przy zastosowaniu dwóch tabletek. Lek skraca czas opróżnienia układu żylną kończyn dolnych. Badania kliniczne, prowadzone zgodnie z zasadą podwójnie ślepej próby i w porównaniu z placebo, wykazały działanie korzystne podczas terapii przewlekłej niewydolności kończyn dolnych, związanej z przyczyną funkcjonalną lub organiczną, a także w objawach żylaków odbytu.

Wskazania terapeutyczne:

Zachowawcza terapia niewydolności żylną kończyn dolnych.

Dawkowanie:

Zwykle: 2 tabletkę dziennie, 1 w południe i 1 wieczorem podczas posiłków

Przeciwwskazania: Znana nadwrażliwość na składniki czynne.

Interakcje z innymi lekami: Nie zaobserwowano istotnych interakcji z innymi lekami. Nie obserwują się interakcji z doustnymi środkami przeciwzakrzepowymi.

Ciąża i laktacja: Chociaż w badaniach nad teratogennością preparatu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, zgodnie z generalną zasadą lek nie powinien być używany podczas 3 pierwszych miesięcy ciąży. Nie badano czy składniki czynne leku wydzielają się z mlekiem matki, tak więc podczas karmienia piersią należy unikać przyjmowania leku.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń: Nie ma wpływu.

Efekty niepożądane: Pelethrocin jest dobrze tolerowany. Sporadycznie może powodować alergię skórą, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy i stany zapalne.

Przedawkowanie: Przedawkowanie może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności. W przypadku przedawkowania klasyczne postępowanie medyczne powinno być wdrożone, tzn. wywołanie wymiotów, płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego oraz w dalszym etapie postępowanie objawowe polegające na zabezpieczeniu funkcji życiowych i perfuzji nerkowej.

Co należy zrobić, jeśli opuści się jedną dawkę?

W przypadku stałego leczenia jeśli opuści się jedną dawkę leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki proszę pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować leczenie tak jak zostało to ustalone.

Data ważności: Nie należy używać leku po upływie daty ważności, która znajduje się na erykiecie pojemnika i opakowaniu.

Przechowywanie: Lek musi być przechowywany w temperaturze 15-25°C i z dala od światła słonecznego.

Ostatnia weryfikacja informacji w ulotce: 05-09-1998

Data zatwierdzenia ulotki: 24-04-2002

INFORMACJE O RACJONALNYM UŻYTKOWANIU LEKÓW:

- Ten lek został Panu/Pani przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem
- Jeśli w trakcie leczenia zaistnieje jakikolwiek problem dotyczący leku proszę poinformować o tym lekarza lub farmaceutę
- Jeśli mają Państwo więcej pytań dotyczących leku, który Państwo przyjmują lub schorzenia, na które Państwo cierpią proszę zapytać lekarza prowadzącego, który powinien udzielić stosownej informacji.
- Aby leczenie, było skuteczne i bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego
- Dla swego zdrowia i bezpieczeństwa powinni Państwo przeczytać uważnie informacje dotyczącą leków, które Państwo przyjmują.
- Nie należy przechowywać leków w szafkach w łazience ze względu na panującą tam wilgotność, która może wpłynąć na właściwości leków - mogą stać się nieskuteczne, bądź wręcz szkodliwe.
- Nie należy przechowywać leków po upływie terminu ważności ani takich, których nie będzie się używać.
- Wszystkie leki należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Producent:

HELP S.A. Pharmaceuticals, 4 Valaoritou Str., 144 52 Metamorphosis, Attika, Greece



MANUFACTURED BY: HELP SA
4, VALAORITOU STR. - 144 52 METAMORPHOSIS, ATTIKA, GREECE
TEL.: +3010.2815353, +3010.2843479
FACTORY: PEDINI IOANNINA - GREECE - TEL.: +30851.092143