

Dotyczy: Rozszerzenia wskazań
do stosowania leku PELETHROCIN

Warszawa, 30 czerwca 2009

Szanowna Pani Magister,
Szanowny Panie Magistrze,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wydaną przez Ministra Zdrowia Decyzją ZD/2502/09 produkt leczniczy PELETHROCIN uzyskał rozszerzenie wskazań do stosowania.

Obecnie wskazania do stosowania PELETHROCIN-u to:
Leczenie objawów związanych z niewydolnością żylną kończyn dolnych:
uczucie ciężkości nóg, ból, nocne kurcze
Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidami).

Wraz z rozszerzeniem wskazań rozszerzeniu uległ także zapis o dawkowaniu **PELETHROCIN-u**:

"Zwykle stosuje się 2 tabletki na dobę (1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem) podczas posiłków.

W przypadku zaostrzenia dolegliwości dotyczących żylaków odbytu dawka wynosi 6 tabletek na dobę (po 2 tabletki trzy razy na dobę) przez pierwsze 4 dni, następnie - przez kolejne 3 dni 4 tabletki (po 2 tabletki dwa razy na dobę)."



W związku z tym, że obecny status PELETHROCIN-u to lek wydawany bez recepty (OTC), a jednocześnie znajdujące się w obrocie starsze opakowania (ani ich ulotki) nie zawierają informacji o nowym wskazaniu wydaje się zasadne przekazanie Państwu informacji, które mogą być pomocne w komunikacji z pacjentami.

Mamy nadzieję, że zmiany dokonane wcześniej w toku harmonizacji oraz obecne rozszerzenie wskazań umożliwią Państwu aktywny wkład w skuteczne leczenie tak zaostrzeń choroby hemoroidalnej jak i niewydolności żylną u Państwa pacjentów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pelethrocin.pl.

(m.in. nową zatwierdzoną ulotkę i charakterystykę leku)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią Ewą Grabowską

tel. 022 664 27 27, fax 022 665 92 72

mail: ewa@blubit.com.pl.

Z poważaniem,

lek. med. Paweł Czekaj
pełnomocnik

www.pelethrocin.pl